



■入院患者 リハビリテーション対象者数（76名）


| | | |
|-------------------|-----|------|
| 回復期リハビリテーション病棟 対象 | 76名 | 100% |
| 一般病棟 対象 | 0名 | 0% |

■区分（76名）

| | | |
|-------|-----|-------|
| 脳血管 I | 53名 | 69.7% |
| 運動器 I | 23名 | 30.3% |


■疾患内訳（76名）

| | | |
|------------|-----|-------|
| 脳血管障害 | 44名 | 58.0% |
| その他脳障害 | 0名 | 0% |
| 廃用症候群 | 7名 | 9.2% |
| 脊髄損傷 | 2名 | 2.6% |
| その他（内科） | 0名 | 0% |
| 大腿骨（頸部等）骨折 | 15名 | 19.7% |
| その他骨折 | 8名 | 10.5% |
| その他（整形） | 0名 | 0% |
| 合計 | 76名 | 100% |



■性別・年齢別 入院患者数（76名）


| | 男性 | | 女性 | | 合計 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 脳血管 | 運動器 | 脳血管 | 運動器 | |
| 20歳未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20～29歳 | 0 | 1名 | 0 | 0 | 1名 |
| 30～39歳 | 1名 | 0 | 0 | 0 | 1名 |
| 40～49歳 | 1名 | 0 | 0 | 0 | 1名 |
| 50～59歳 | 0 | 0 | 3名 | 0 | 3名 |
| 60～69歳 | 10名 | 0 | 4名 | 1名 | 15名 |
| 70～79歳 | 6名 | 1名 | 7名 | 6名 | 20名 |
| 80～89歳 | 4名 | 1名 | 13名 | 9名 | 27名 |
| 90歳以上 | 2名 | 1名 | 2名 | 3名 | 8名 |
| 合計 | 24名 | 4名 | 29名 | 19名 | 76名 |






■ 在院日数（入院から退院までの日数）

| | 脳血管 | 運動器 | 合計 |
|----------|-----|-----|-----|
| 30日以下 | 3名 | 4名 | 7名 |
| 31～60日 | 8名 | 5名 | 13名 |
| 61～90日 | 8名 | 14名 | 22名 |
| 91～120日 | 7名 | 0 | 7名 |
| 121～150日 | 12名 | 0 | 12名 |
| 151～180日 | 15名 | 0 | 15名 |
| 180日以上 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 53名 | 23名 | 76名 |



■ 退院先

| | | |
|----------|-----|-------|
| 自宅 | 47名 | 61.8% |
| 介護老人保健施設 | 5名 | 6.6% |
| 福祉施設 | 12名 | 15.8% |
| 急性期病院 | 6名 | 7.9% |
| その他医療施設 | 4名 | 5.3% |
| 死亡退院 | 2名 | 2.6% |
| 合計 | 76名 | 100% |






■ リハビリテーション効果 ～ FIM(機能的自立度評価法)改善度 ～

脳血管


| | 入院時 | 退院時 |
|----------|-------|-------|
| 自宅 | 79.6点 | 97.8点 |
| 介護老人保健施設 | 36点 | 42点 |
| 福祉施設 | 41.9点 | 53点 |
| 急性期病院 | 46点 | 56.3点 |
| その他医療施設 | 62.6点 | 52点 |
| 死亡退院 | 0点 | 0点 |



脳血管 平均改善点数：13.26点

運動器

| | 入院時 | 退院時 |
|----------|-------|-------|
| 自宅 | 89.9点 | 103点 |
| 介護老人保健施設 | 70点 | 94点 |
| 福祉施設 | 62.2点 | 80.8点 |
| 急性期病院 | 0点 | 0点 |
| その他医療施設 | 0点 | 0点 |
| 死亡退院 | 62.5点 | 0点 |



運動器 平均改善点数：14.66点