




■ 区分(143名)

脳血管	76名	51.3%
廃用	18名	12.6%
運動器	49名	34.3%

■ 疾患内訳(143名)

脳血管障害	54名	37.8%
その他脳障害	22名	15.4%
廃用症候群	18名	12.6%
脊髄損傷	0名	0.0%
その他内科	0名	0.0%
大腿骨骨折	29名	20.3%
脊椎圧迫骨折	7名	4.9%
その他骨折	7名	4.9%
その他整形	6名	4.2%
合計	143名	100.0%




■ 性別・年齢別 入院患者数(143名)

	男 性			女 性			合計
	脳血管	運動器	廃用	脳血管	運動器	廃用	
20歳未満	0	0	0	0	0	0	0
20～29歳	0	0	0	0	0	0	0
30～39歳	0	0	0	0	0	0	0
40～49歳	1名	0	0	0	1名	0	2名
50～59歳	2名	1名	0	0	0	0	3名
60～69歳	10名	1名	0	3名	1名	1名	16名
70～79歳	19名	3名	2名	10名	9名	3名	46名
80～89歳	14名	7名	5名	12名	15名	4名	57名
90歳以上	2名	3名	0	3名	8名	3名	19名
合計	48名	15名	7名	28名	34名	11名	143名

	平均
脳血管	75.9歳
運動器	81.5歳
廃用	82.0歳
全体	78.6歳



<性別・年齢別 入院患者>




■ 在院日数(入院から退院までの日数)

	脳血管	運動器	廃用	合計
30日以下	8名	3名	2名	13名
31～60日	7名	9名	7名	23名
61～90日	12名	37名	9名	58名
91～120日	16名	0	0	16名
121～150日	16名	0	0	16名
151～180日	17名	0	0	17名
180日以上	0	0	0	0
合計	76名	49名	18名	143名

	平均
脳血管	106.2日
運動器	72.2日
廃用	62.6日
全体	89.0日


<在院日数>





■ 退院先

自宅	82名	59.4%
介護老人保健施設	15名	10.9%
福祉施設	14名	10.1%
急性期病院	17名	12.3%
その他医療施設	7名	5.1%
死亡退院	3名	2.2%
合計	138名	100.0%




< 退院先 >

■ リハビリテーション効果 ～ FIM (機能的自立度評価法) 改善度 ～

《 脳血管 》

	入院時	退院時
自宅	79.8点	96.0点
介護老人保健施設	52.7点	61.8点
福祉施設	38.8点	49.0点
急性期病院	47.9点	45.9点
その他医療施設	0点	0点
死亡退院	24点	18点




脳血管 平均改善点数：10.4点



■リハビリテーション効果 ～FIM(機能的自立度評価法)改善度～

《運動器》


	入院時	退院時
自宅	82.7点	99.5点
介護老人保健施設	61.0点	76.2点
福祉施設	58.4点	75.6点
急性期病院	68.0点	73.8点
その他医療施設	0点	0点
死亡退院	56点	18点



運動器 平均改善点数：15.5点

《廃用》

	入院時	退院時
自宅	80.6点	99.0点
介護老人保健施設	48.5点	54.0点
福祉施設	48.6点	64.3点
急性期病院	62.2点	56.2点
その他医療施設	69点	76点
死亡退院	36点	18点



廃用 平均改善点数：8.0点